



JRS/CMC/FAG

Santiago, 11 de Junio de 2012

NOTA INFORMATIVA DE SEGURIDAD SOBRE DOXICICLINA DIRIGIDA A LOS PACIENTES

Forma correcta de administrar Doxiciclina

La Doxiciclina pertenece a un grupo de medicamentos denominados tetraciclinas, que son antibióticos activos frente a un amplio grupo de gérmenes. Este antibiótico está indicado en el tratamiento de diversas infecciones, incluyendo el acné común (*acné vulgaris*).

Como todos los medicamentos, Doxiciclina puede producir reacciones adversas, entre las cuales se ha descrito molestias en el tracto esofágico, que incluyen dificultad para tragar, inflamación, irritación o incluso úlceras en la región esofágica. Estas manifestaciones son más frecuentes cuando el medicamento es ingerido de una manera inadecuada.

Con el propósito de disminuir el riesgo de experimentar inconvenientes con la administración de Doxiciclina, informamos a aquellos pacientes a los que les ha sido indicado este antibiótico por su médico tratante, que deben seguir las siguientes instrucciones:

Este medicamento debe tomarse en el transcurso de una comida, acompañado de un vaso grande de agua, (200 mL).

Es importante que, después de tomar el medicamento, se deje transcurrir al menos una hora antes de recostarse o acostarse para dormir.

El no seguir estas instrucciones puede favorecer la aparición de problemas esofágicos y gastrointestinales como efectos adversos. Si experimenta alguna reacción adversa durante el tratamiento con Doxiciclina, consulte a su médico o químico farmacéutico, los que podrán orientarle y la vez comunicar la sospecha de la reacción adversa al Sub-Departamento de Farmacovigilancia de este Instituto.


DRA. MARIA TERESA VALENZUELA BRAVO
DIRECTORA
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA